

# DOS 20 ANOS À TERCEIRA IDADE

## CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO 2021-2022

A recomendação de vacinas para adultos e idosos deve ser individualizada, de acordo com o histórico pessoal e vacinas recebidas anteriormente.

**VACINAS COVID-19**  
 Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: [sbim.org.br/covid-19](http://sbim.org.br/covid-19)

- Rotina
- Recomendada em situações que justifiquem: presença de comorbidades, risco epidemiológico, entre outros
- Contraindicada

Vacinas	20 a 45 anos	46 a 49 anos	50 a 59 anos	60 anos ou mais	Gestantes
SCR		DUAS DOSES: 0 - 1 MÊS		●	●
Hepatite A		DUAS DOSES: 0 - 6 MESES		●	●
Hepatite B		TRÊS DOSES: 0 - 1 - 6 MESES			SE NÃO VACINADA
HPV	TRÊS DOSES: 0 - 1 A 2 - 6 MESES	DE ACORDO COM RECOMENDAÇÃO DA BULA OU ORIENTAÇÃO MÉDICA			●
dTpa		UMA DOSE A CADA DEZANOS			A CADA GESTAÇÃO
dT		UMA OU DUAS DOSES DE dT APÓS A DOSE DE dTpa PARA OS NÃO ADEQUADAMENTE VACINADOS PARA O TÉTANO			
Varicela	DUAS DOSES: 0 - 1 MÊS				●
Influenza (gripe)	UMA DOSE ANUAL				
Meningocócicas conjugadas ACWY/C		●		●	●
Meningocócica B		●			●
Febre amarela		UMA DOSE		●	●
VPC13		●		UMA DOSE	●
VPP23		●		DUAS DOSES: SEIS MESES APÓS VPC13 E CINCO ANOS APÓS A PRIMEIRA VPP23	●
Herpes zóster			●	UMA DOSE	●
Dengue*	●		●		●

16/05/2021 • Este calendário não substitui a recomendação médica. Converse com seu médico sobre vacinação. Para mais informações consulte os *Calendários de vacinação SBIM* – [sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao](http://sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao).

\* Recomenda-se que pessoas soronegativas para dengue não recebam a vacina.

SCR Sarampo, caxumba e rubéola  
 dT Dupla do tipo adulto  
 dTpa Difteria, tétano e coqueluche (tríplice bacteriana acelular do adulto)  
 VPC13 Vacina pneumocócica conjugada 13 valente  
 VPP23 Vacina pneumocócica polissacarídica 23 valente