

# CALENDÁRIO VACINAL SBIIm 2021/2022

## Do nascimento à terceira idade

VACINAS COVID-19 – Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: [sbim.org.br/covid-19](http://sbim.org.br/covid-19)



| VACINAS                                     | DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE  |  |         |         |         |         |         |  |   |  |  |          |   |   | ADOLESCENTE  |  | ADULTO  | IDOSO  | DISPONIBILIDADE DAS VACINAS |   |  |   |           |                                      |                   |            |     |     |
|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|--|--|----------|---|---|--|--|---|--|-----------------------------|---|--|---|-----------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|
|   | Ao nascer   | 1 mês                                  | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses  | 8 meses   | 9 meses  | 12 meses   | 15 meses | 18 meses  | 24 meses  | 4 anos   | 5 anos                                     | 6 anos  | 9 anos   | 10 anos                     | 11 a 19 anos                                | 20 a 59 anos   | A partir de 60 anos                             | GRATUITAS | NA REDE PÚBLICA                      | CLÍNICAS PRIVADAS | NOS CRIES* |     |     |
| BCG ID                                      | 1 Dose  | Vacinar os não vacinados anteriormente |         |         |         |         |         |  |   |  |  |          |   |   |  | Vacinar pessoas contactantes de hanseníase |   |  |                             |   | SIM  | SIM   | NÃO       |                                      |                   |            |     |     |
| Hepatite B                                  | Três ou quatro doses a partir do nascimento   |  |         |         |         |         |         | Vacinar os não vacinados anteriormente             |   |  |  |          |   |   |  |  |   |  |                             |   |  | SIM   | SIM       | SIM                                  |                   |            |     |     |
| Rotavírus                                   | Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.   |  |         |         |         |         |         | CONTRAINDICADA                                     |   |  |  |          |   |   |  |  |   |  |                             |   |  | SIM   | SIM       | NÃO                                  |                   |            |     |     |
| Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)    | Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade  |  |         |         |         |         |         | REFORÇO  | Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa  |  | Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT) |          |   |   |  |  |   |  |                             |   | SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde | SIM, DTPa e dTpa                                | SIM, DTPa |                                      |                   |            |     |     |
| Haemophilus influenzae b                    | Três doses iniciando aos 2 meses de idade   |  |         |         |         |         |         | REFORÇO  | Vacinar os não vacinados anteriormente  |  | Vacinar pessoas em situações especiais de risco  |          |   |   |  |  |   |  |                             |   | SIM, três primeiras doses                                    | SIM   | SIM       |                                      |                   |            |     |     |
| Poliomielite (vírus inativados)             | Três doses iniciando aos 2 meses de idade   |  |         |         |         |         |         | REFORÇO  | REFORÇO   |  | Vacinar pessoas em situações especiais de risco  |          |   |   |  |  |   |  |                             |   | SIM, três primeiras doses                                    | SIM   | SIM       |                                      |                   |            |     |     |
| Pneumocóccas conjugadas                     | Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade  |  |         |         |         |         |         | REFORÇO  | VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente   |  | VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco   |          |   |   |  | VPC13: uma dose                            |   | SIM, VPC10, menores de 5 anos                                | SIM                         | SIM, VPC10 e VPC13                          |  |   |           |                                      |                   |            |     |     |
| Meningocóccas conjugadas                    | Duas doses iniciando aos 3 meses de idade   |  |         |         |         |         |         | REFORÇO  | REFORÇO   |  | REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos              |          | Vacinar pessoas em situações especiais de risco |   |  |  |   | SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 12 anos | SIM                         | SIM, menC e menACWY                         |  |   |           |                                      |                   |            |     |     |
| Meningocócica B                             | Duas doses iniciando aos 3 meses de idade   |  |         |         |         |         |         | REFORÇO  | Para os não vacinados anteriormente – De 12 a 23 meses e 29 dias: três doses. De 24 meses a 19 anos: duas doses |  |  |          |   | Vacinar pessoas em situações especiais de risco |  |  |   |  | NÃO                         | SIM   | NÃO  |   |           |                                      |                   |            |     |     |
| Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)   | CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO  |  |         |         |         |         |         |  |   |  |  |          |   |   |  |  |   |  |                             | SIM   | NÃO  | NÃO   |           |                                      |                   |            |     |     |
| Influenza (gripe)                           | VACINAÇÃO ANUAL   |  |         |         |         |         |         |  |   |  |  |          |   |   |  |  |   |  |                             | SIM, menores de 6 anos e maiores de 60 anos | SIM  | SIM   |           |                                      |                   |            |     |     |
| Febre amarela                               | Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias, dose única. Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal. |  |         |         |         |         |         |  |   |  |  |          |   |   |  |  |   |  |                             | SIM   | SIM  | NÃO   |           |                                      |                   |            |     |     |
| Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) | Duas doses a partir dos 12 meses  |  |         |         |         |         |         | Vacinar os não vacinados anteriormente             |   |  |  |          |   |   |  |  |   |  |                             |   |  | Vacinar pessoas em situações especiais de risco |           | SIM, até 59 anos                     | SIM               | NÃO        |     |     |
| Varicela (catapora)                         | Duas doses a partir dos 12 meses  |  |         |         |         |         |         | Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente |   |  |  |          |   |   |  |  |   |  |                             |   |  |   |           | SIM                                  | SIM               | SIM        |     |     |
| Hepatite A                                  | Duas doses a partir dos 12 meses  |  |         |         |         |         |         | Vacinar os não vacinados anteriormente             |   |  |  |          |   |   |  |  |   |  |                             |   |  | Vacinar pessoas em situações especiais de risco |           | SIM, uma dose para menores de 5 anos | SIM               | SIM        |     |     |
| HPV   |   |  |         |         |         |         |         | Duas doses para meninas e meninos                  |   | Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses. |  |          |   |   | Vacinar os não vacinados anteriormente, a critério médico (três doses)                           |  | SIM, duas doses. Meninas (9 a 14 anos) e meninos (11 a 14 anos) |  |                             |   |  | SIM   | SIM       |                                      |                   |            |     |     |
| Pneumocócica 23 valente                     | Vacinar pessoas em situações especiais de risco   |  |         |         |         |         |         |  |   |  |  |          |   |   | Duas doses com intervalo de cinco anos   |  | NÃO   |  |                             |   |  | SIM   | SIM       |                                      |                   |            |     |     |
| Herpes zóster                               |   |  |         |         |         |         |         |  |   |  |  |          |   |   | De 50 a 59 anos: a critério médico   |  | Uma dose  |  |                             |   |  | NÃO   |           |                                      |                   |            | SIM | NÃO |
| Dengue                                      | CONTRAINDICADA  |  |         |         |         |         |         |  |   |  |  |          |   |   | Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses |  |   |  |                             | CONTRAINDICADA                              |  | NÃO   |           |                                      |                   |            | SIM | NÃO |

10/05/2021 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIIm 2021/2022* e nos *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

\* Consultar manual do CRIE em <http://portal.arquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/11/manual-centros-referencia-imunobiologicos-especiais-5ed.pdf>

Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.



Manual do CRIE



Calendários de vacinação SBIIm