

A recomendação de vacinas para adultos e idosos deve ser individualizada, de acordo com o histórico pessoal e vacinas recebidas anteriormente.

**VACINAS COVID-19**  
Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: [sbim.org.br/covid-19](http://sbim.org.br/covid-19)

- Rotina
- Recomendada em situações que justifiquem: presença de comorbidades, risco epidemiológico, entre outros
- Contraindicada

Vacinas	20 a 45 anos	46 a 49 anos	50 a 59 anos	60+ anos	Gestantes
SCR	DUAS DOSES: 0 - 1 MÊS			●	●
Hepatite A	DUAS DOSES: 0 - 6 MESES			●	●
Hepatite B	TRÊS DOSES: 0 - 1 - 6 MESES				SE NÃO VACINADA
HPV	TRÊS DOSES: 0 - 1 A 2 - 6 MESES	USO FORA DE BULA A CRITÉRIO MÉDICO			●
dTpa	UMA DOSE A CADA DEZ ANOS				A CADA GESTAÇÃO
dT	UMA OU DUAS DOSES DE dT APÓS A DOSE DE dTpa PARA OS NÃO ADEQUADAMENTE VACINADOS PARA O TÉTANO				
Varicela	PARA SUSCETÍVEIS: DUAS DOSES: 0 - 1 MÊS			●	●
Influenza (gripe, Tri ou Tetravalente)	UMA DOSE ANUAL				
Meningocócicas conjugadas (ACWY ou C)*		●		●	●
Meningocócica B	●	USO FORA DE BULA A CRITÉRIO MÉDICO			
Febre amarela	UMA DOSE			●	●
VPC13		●		UMA DOSE	●
VPP23		●		DUAS DOSES: SEIS MESES APÓS VPC13 E CINCO ANOS APÓS A PRIMEIRA VPP23	●
Herpes zóster**	vacina atenuada			DOSE ÚNICA	
	vacina inativada			DUAS DOSES: 0 - 2 MESES	
Dengue***	●		●		●
Covid-19	VACINAS E NÚMERO DE DOSES DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO PNI PARA CADA GRUPO				

\* Preferir a menACWY.

\*\* A vacina inativada é preferível pela maior eficácia e duração da proteção e é recomendada para vacinados previamente com a vacina atenuada, respeitando intervalo mínimo de dois meses entre elas.

\*\*\* Recomendada para pessoas de até 45 anos soropositivas para dengue.

SCR	Sarampo, caxumba e rubéola
dT	Dupla do tipo adulto (difteria e tétano)
dTpa	Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche)
VPC13	Vacina pneumocócica conjugada 13 valente
VPP23	Vacina pneumocócica polissacarídica 23 valente