

# CALENDÁRIO VACINAL SBIIm 2022/2023

## Do nascimento à terceira idade



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																ADOLESCENTE			ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS				
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*		
<b>BCG ID</b>	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente													Vacinar pessoas contactantes de hanseníase						SIM	SIM	NÃO				
<b>Hepatite B</b>	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente																SIM	SIM	SIM	
<b>Rotavírus</b>	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.			<b>CONTRAINDICADA</b>																SIM	SIM	NÃO					
<b>Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)</b>	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO						Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)						SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa		
<b>Haemophilus influenzae b</b>	Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco											SIM, três primeiras doses	SIM	SIM
<b>Poliomielite (vírus inativados)</b>	Três doses iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	REFORÇO					Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses	SIM	SIM		
<b>Pneumocócicas conjugadas</b>	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade										REFORÇO	VPC10 ou VPC13 – Vacinar os não vacinados anteriormente					VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco			VPC13: uma dose		SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10 e VPC13			
<b>Meningocócicas conjugadas</b>	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	REFORÇO					Reforço aos 11 e 16 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos		Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 12 anos	SIM	SIM, menC e menACWY			
<b>Meningocócica B</b>	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade										REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – Duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada					Vacinar pessoas em situações especiais de risco			NÃO	SIM	NÃO					
<b>Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)</b>	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																SIM	NÃO	NÃO								
<b>Influenza (gripe)</b>	VACINAÇÃO ANUAL																SIM, menores de 5 anos e maiores de 60 anos			SIM	SIM						
<b>Febre amarela</b>	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias: dose única. Como não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina, de acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose em outras idades pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal																SIM	SIM	NÃO								
<b>Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)</b>	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, até 59 anos	SIM	NÃO					
<b>Varicela (catapora)</b>	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM	SIM	SIM					
<b>Hepatite A</b>	Duas doses a partir dos 12 meses										Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM					
<b>HPV</b>											Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.				Vacinar não vacinados e pessoas em situações especiais de risco, a critério médico (três doses)			SIM, duas doses para meninas e meninos de 9 a 14 anos.	SIM	SIM, três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais					
<b>Pneumocócica 23 valente</b>	Vacinar pessoas em situações especiais de risco																Duas doses com intervalo de cinco anos		NÃO	SIM	SIM						
<b>Herpes zóster</b>	A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco																Rotina a partir dos 50 anos			NÃO	SIM	NÃO					
<b>Dengue</b>	<b>CONTRAINDICADA</b>																Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 6 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses			<b>CONTRAINDICADA</b>			NÃO	SIM	NÃO		
<b>Covid-19</b>	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: <a href="http://sbim.org.br/covid-19">sbim.org.br/covid-19</a>																										
VACINAS	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*		
	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																ADOLESCENTE	ADULTO	IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS							

12/01/2023 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos Calendários de vacinação SBIIm 2021/2022 e nos Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais.


\* Consultar manual do CRIE em [https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual\\_centros\\_imunobiologicos\\_especiais\\_5ed.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_centros_imunobiologicos_especiais_5ed.pdf) (acesso em 01.09.2022)

Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais.

- Rotina
- Vacinar não vacinados
- Situações especiais
- Contraindicada



Manual do CRIE



Calendários de vacinação SBIIm